

Program běžného očkování u dětí

Jednotlivé očkování se podává jedinou injekcí do svalu dolní končetiny nebo horní paže dítěte.

| V kolika letech očkovat | Ochrana proti onemocněním | Podávané očkování |
|---|--|--|
| Dva měsíce | záškrt, tetanus, černý kašel (dávivý kašel), dětská obrna a hemofilní chřipka typu b (Hib) pneumokokální infekce | DTaP/IPV/Hib a pneumokokální konjugční vakcína PKV (PCV) |
| Tři měsíce | záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna a DTaP/IPV/Hib a hemofilní chřipka typu b (Hib) zápal mozkových blan C (meningokokální skupina C) | MenC |
| Čtyři měsíce | záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna a DTaP/IPV/Hib, hemofilní chřipka typu b (Hib) zápal mozkových blan C pneumokokální infekce | MenC a PKV (PCV) |
| Kolem 12. měsíců | hemofilní chřipka typu b (Hib) a zápal mozkových blan C | Hib/MenC |
| Kolem 13. měsíců | spalničky, příušnice a zarděnky (německé spalničky) pneumokokální infekce | SPZ (MMR) a PKV (PCV) |
| Tři roky a čtyři měsíce nebo brzy poté | záškrt, tetanus, černý kašel a dětská obrna spalničky, příušnice a zarděnky | DTaP/IPV nebo dTaP/IPV a SPZ (MMR) |
| Děvčata ve věku od 12. do 13. let | rakovina děložního krčku způsobená epitelovým virem typu 16 a 18 | HPV |
| 13 až 18 let | Tetanus, záškrt a dětská obrna | Td/IPV |

Očkování, které se běžně neprovádí u dětí, které jsou vystaveny rizikům

| V kolika letech očkovat | Ochrana proti onemocněním | Podávané očkování |
|---|---------------------------|-------------------|
| Při narození (dětmi, které přijdou) | Tuberkulóza | BCG |

pravděpodobněji do kontaktu
s TB než zbytek běžné
populace)

Při narození Hepatitis B
(dětmi, které mají matku nositelku žloutenky typu B)

Hep B